

Barbatella di petit rouge infetta
da Flavescenza dorata

CORRETTA GESTIONE DEI NUOVI IMPIANTI E DEI RIMPIAZZI

Usare solo materiale di moltiplicazione accompagnato da passaporto fitosanitario. Evitare di rimpiazzare le viti sintomatiche nelle fasi epidemiche della malattia. Se le piante sintomatiche superano il 20% di quelle presenti nell'appezzamento occorre espianare l'intero vigneto. Non sovrainnestare piante malate, ed evitare, nei vigneti sani, il sovrainnesto con materiale vegetale non opportunamente controllato o autoprodotta perché può contribuire alla diffusione del fitoplasma.

ELIMINAZIONE DELLE VITI ABBANDONATE ANCHE IN ASSENZA DI SINTOMI

Nelle zone colpite dalla malattia, le superfici vitate abbandonate così come le viti inselvaticate costituiscono dei pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e pertanto devono essere eliminate.

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO A FLAVESCENTZA DORATA PREVEDE L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 19/2021

Per maggiori informazioni:

**Assessorato Agricoltura e Risorse naturali,
Ufficio servizi fitosanitari**
località La Maladière - Rue de la Maladière n. 39,
Saint-Christophe
(responsabile tecnico Sandro Dallou,
tel. 0165.275382/340.0634624
ispettore fitosanitario Rita Bonfanti,
tel. 0165.275405/0165.275420)



FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

Una fitopatia da conoscere e da combattere



Adulto di *S. titanus*
su trappola cromotropica



Adulto scafoideo



Larva scaphoideus
titanus



COS'È

La Flavescenza dorata è una fitopatia da quarantena causata da un **fitoplasma** responsabile di un grave deperimento vegetativo e produttivo della vite. Questa malattia sta destando notevole preoccupazione negli operatori del settore per il trend di espansione che da qualche anno interessa le regioni viticole del Nord Italia.

La trasmissione della fitopatia avviene attraverso le punture di un insetto vettore chiamato *Scaphoideus titanus*.

I SINTOMI CHIAVE DI FLAVESCENZA DORATA

- 1- Germogliamento stentato delle piante e presenza di gemme cieche (sintomo aspecifico).
- 2- Ingiallimenti o arrossamenti dei lembi e delle nervature fogliari, accompagnati da inspessimenti, accartocciamenti e bollosità dei tessuti.
- 3- Assenza di lignificazione dei tralci e comparsa, talvolta, di pustole nere oleose alla loro base.
- 4- Appassimenti e disseccamenti delle infiorescenze e/o dei grappoli.

COME SI COMBATTE ESTIRPO TEMPESTIVO DELLE PIANTE DI VITE SINTOMATICHE

Di fondamentale importanza è l'ispezione dei vigneti da parte del conduttore/proprietario che deve eseguirle più volte durante la stagione vegetativa al fine di rilevare la comparsa di viti sintomatiche. Nelle zone focolaio e in quelle dove la

malattia è insediata, le piante sintomatiche devono essere subito capitozzate. Al taglio della parte aerea deve seguire l'eliminazione dell'intera pianta, quest'ultima operazione può essere rimandata all'autunno.

Nelle zone indenni e in quelle cuscinetto, prima di procedere alla capitozzatura delle piante sintomatiche, occorre avvisare i tecnici dell'ufficio servizi fitosanitari affinché procedano al campionamento per un'analisi di conferma.

Attenzione: è necessario che alla capitozzatura segua sempre l'estirpo perché il taglio della sola parte aerea non consente il risanamento.

LOTTA AL VETTORE

Nelle zone focolaio e in quelle dove la malattia è insediata, occorre trattare le viti nei tempi e con i prodotti indicati annualmente negli avvisi dell'Ufficio servizi fitosanitari regionale.

I trattamenti devono essere eseguiti acidificando l'acqua e, ove possibile, usando solo l'insetticida.

Dopo ogni trattamento, occorre verificarne l'efficacia (a distanza di almeno una settimana) attraverso l'ispezione delle foglie basali dei ceppi alla ricerca delle forme larvali dell'insetto vettore o appendendo in vigneto, a partire dal mese di luglio, le trappole cromotropiche gialle per la cattura degli adulti.

L'ufficio servizi fitosanitari regionale è a disposizione per consigli tecnici riguardanti i trattamenti e per il riconoscimento delle piante sintomatiche e del vettore.

Disseccamento
del grappolo



Sintomi di Flavescenza dorata
su foglie di vitigno a bacca rossa



Trappola cromotropica per la cattura
degli adulti di *Scaphoideus titanus*

