

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali  
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali  
**Avviso fitosanitario del 3 giugno 2024 – viticoltura**  
**Difesa da Peronospora, Black rot e Oidio della vite**

Nei vigneti più precoci della bassa valle siamo in piena fioritura mentre nel centro valle sta iniziando.

In questa fase particolarmente delicata **si raccomanda di mantenere intervalli ristretti tra i trattamenti (8-10 giorni) per mantenere una copertura efficace su tutte le malattie fungine. In fioritura sono da preferire prodotti senza rame.**

**LOTTA CHIMICA**

Non appena le condizioni meteo lo consentono intervenire tempestivamente con una delle miscele di principi attivi di seguito elencate:

| MISCELA DI P.A. ANTIPERONOSPORICI   | NOTE  |
|-------------------------------------|---|
| <b>Fluopicolide + Fosetil di Al</b> | Quando si sceglie di utilizzare Fosetil Al è opportuno continuare con lo stesso principio attivo nel proseguimento della lotta alla peronospora, almeno una seconda volta |
| <b>Ciazofamide</b>                  |   |
| <b>Dimetomorph + Zoxamide</b>       | (Attenzione, il Dimetomorph è stato revocato, termine ultimo per l'utilizzo il 20-05-2025)  |
| <b>Dimetomorph + Ametoctradin</b>   |   |
| <b>Mandipropamide + Rame</b>        |   |
| <b>Cimoxanil + Fosetil di Al</b>    |   |
| <b>Famoxadone + Cimoxanil</b>       |   |

**Solo nei vigneti dove sono presenti macchie di infezione primaria preferire i seguenti prodotti**

| MISCELA DI P.A. ANTIPERONOSPORICI | NOTE |
|-----------------------------------|------|
| <b>Metalaxil M + rame</b>         |      |
| <b>Benalaxil M+ folpet</b>        |      |

A cui occorre miscelare uno dei seguenti principi attivi antioidici:

| P.A. ANTIOIDICI                          | NOTE                                     |
|--|--|
| <b>Zolfo bagnabile</b>                   | Efficace con temperatura di almeno 18 °C |
| <b>Bupirimate</b>                        |  |
| <b>Spiroxamina</b>                       |  |
| <b>Azoxistrobin</b>                      | Efficace anche contro il Black rot       |
| <b>Trifloxistrobin + zolfo bagnabile</b> | Efficace anche contro il Black rot       |
| <b>Fluxapiroxad + zolfo bagnabile</b>    | Efficace anche contro il Black rot       |

**In questo periodo la vite si sviluppa rapidamente, pertanto, anche in assenza di pioggia, occorrerà ripetere gli interventi con regolarità. L'intervallo tra un trattamento e l'altro varia a seconda dei prodotti impiegati e delle condizioni climatiche (sentire il tecnico per indicazioni). Il trattamento dovrà comunque essere ripetuto dopo piogge di intensità superiori a 40 mm che dilavano la copertura.**

## **LOTTA BIOLOGICA**

**Peronospora:** intervenire con un prodotto a base di **Rame**. Preferire dosaggi più bassi a intervalli ridotti tra un trattamento e l'altro per avere una migliore copertura della vegetazione in rapida crescita.

**Oidio:** miscelare al rame un prodotto a base di **zolfo bagnabile**.

Per migliorare la difesa antioidica è possibile miscelare **zolfo bagnabile** degli **induttori di resistenza** quali: **Cerevisane o COS-OGA** (eseguire 2 blocchi di interventi, con 3 trattamenti a blocco a distanza di 8-10 giorni e fare una pausa di almeno 14 gg prima di un secondo blocco) o **Laminarina** (intervenire a blocchi di 3 interventi a 7-8 gg con una pausa di almeno 14 gg prima di un secondo blocco).

**I trattamenti devono essere sempre effettuati su piante asciutte sia in caso di difesa chimica, sia in caso di difesa biologica. Per chiarimenti sulla strategia da utilizzare contattare il proprio tecnico di riferimento.**

Sul sito della regione, nella pagina del servizio fitosanitario è presente la scheda dei trattamenti per la vite, nell'ultima pagina è indicato un esempio di strategia per la difesa. Di seguito il link:

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp)

**ATTENZIONE:** In base a quanto stabilito dal regolamento UE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal comunicato del Ministero della Salute del 31 gennaio 2019, per i **prodotti rameici** è previsto il vincolo di non superare l'applicazione di **28 kg/ha di rame (metallo)** nell'arco di 7 anni. Si consiglia di rispettare il quantitativo massimo di 4 kg/ha per anno.

**Gli aderenti alla misura 10.1.3 devono controllare le limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina:**

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/disciplinare\\_produzione\\_integrata\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx)

**ATTENZIONE: per proteggere il patrimonio apistico da possibili effetti negativi provocati da trattamenti fitosanitari è vietato trattare le piante fiorite con prodotti insetticidi, aficidi, acaricidi, diserbanti e disseccanti ed è obbligatorio sfalcare le erbe fiorite presenti sotto-chioma prima di distribuire la miscela fitosanitaria. Queste, e altre indicazioni utili alla salvaguardia delle api, sono contenute nelle linee guida e istruzioni operative approvate con PD n. 1265/2020 e consultabili alla pagina web:**

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx)

Si raccomanda l'osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (in prossimità di aree frequentate da popolazione o gruppi vulnerabili occorre apporre apposita cartellonistica e utilizzare prodotti che non riportino in etichetta determinate frasi di rischio). Fondamentale è inoltre il rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali relative alle distanze da rispettare dai corsi d'acqua o da altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.

*Per maggiori informazioni:*

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382-86/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275420)

[www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura)

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional